

TERAPÊUTICA DOMICILIÁRIA NA DOENÇA RENAL CRÓNICA



14 Março 2019

Baxter

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÓNICA

Perda progressiva da função renal durante meses ou anos



Requer tratamento de substituição da função renal



6.^a causa de morte no mundo¹



800.000

DOENTES EM PORTUGAL²



2.200

NOVOS DOENTES/ANO³



+12.000

EM TRATAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA FUNÇÃO RENAL⁴



TRATAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO RENAL

DIÁLISE


- ✓ Hemodiálise
- ✓ **DIÁLISE PERITONEAL**

TRANSPLANTE RENAL

Técnica de Diálise realizada pelo Doente em casa

Diálise Peritoneal Automática (DPA):

enquanto o Doente dorme



Diálise peritoneal manual (DPCA):


o Doente faz um procedimento manual simples



Doente em tratamento em casa



Monitorização Remota



Profissionais de Saúde no hospital

MONITORIZAÇÃO REMOTA

Atualização remota
Suporte técnico
Deteção atempada de incidências
Ajustes na terapêutica
Controlo dos dados em tempo real

Aumento do controlo, segurança e adesão ao tratamento; redução do número de visitas não planeadas ao hospital; poupança de recursos⁵

¹ World Kidney Day; 2019 WKD Theme; Accessed March 6, 2019 from: <https://www.worldkidneyday.org/2019-campaign/2019-wkd-theme/> ² Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN) ³ Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN) ⁴ Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN) ⁵ Remote Monitoring of Chronic Diseases: A Landscape Assessment of Policies in Four European Countries, Baxter 2016